

Las lesiones orales usualmente son muy dolorosas y deben ser tratadas por un dentista lo más rápido posible. Las urgencias dentales pueden incluir dientes que han sido sacados fuera de sitio por algún golpe (extraído por la fuerza), forzado fuera de su posición (forzar hacia afuera) o quebrados (fracturado). En ocasiones los labios, las encías o las mejillas reciben cortaduras.

## Dientes Extraídos Por Fuerza

Cuando un diente es extraído por algún golpe usted debe:

- Intentar encontrar el diente
- Inmediatamente llame a su dentista para una cita de urgencia.
- Suavemente lave el diente, pero no lo frote para remover la tierra o alguna basurita
- Coloque el diente limpio en su boca entre su mejilla y la encía
- No intente reponer el diente en su hueco. Esto puede causar más daños.
- Consiga al dentista lo más rápido posible. Si es dentro de media hora a partir de la lesión, es posible que se pueda reimplantar el diente.
- Si no es posible guardar el diente en la boca de la persona lesionada (por ejemplo en el caso de un niño) envuelva el diente en alguna tela o gasa y luego sumérgalo en leche

## Dientes Forzados Fuera De Su Posición

Si el diente es forzado fuera de lugar (hacia adentro o hacia afuera), debe ser devuelto a su alineación normal con muy poca presión del dedo. No fuerce el diente adentro de su hueco. Sujete el diente en su lugar con un papel de seda húmedo o con una gasa. Nuevamente, es vital que un dentista vea a la persona lesionada tan pronto como sea posible.

## Dientes Quebrados

La manera cómo se manejará un diente quebrado dependerá de cuánto se haya quebrado el diente. Un dentista siempre deberá ser consultado tan pronto como sea posible para determinar el tratamiento adecuado, sin importar la magnitud del daño.

**Fracturas menores** – Las fracturas menores pueden ser suavizadas por su dentista con un disco de papel de lija o sencillamente pueden dejarse tal como están. Otra opción es restaurar el diente con una restauración de composite. En cualquiera de los casos, usted debe tratar el diente con cuidado durante varios días.

**Fractura moderada** - Las fracturas moderadas incluyen daños al esmalte, dentina o pulpa. Si la pulpa no se ha dañado permanentemente, existen una variedad de procedimientos con los cuales su dentista puede restaurar su diente a su forma y función original, incluyendo la colocación de una corona permanente. De ocurrir daño a la pulpa, puede que sea necesario tratamiento dental adicional.

**Fractura severa** – Las fracturas severas pueden significar un diente traumatizado con una probabilidad mínima de recuperación. Sin embargo, existen procedimientos odontológicos disponibles para restaurar hasta los dientes con daños severos y se deberá consultar a un dentista lo más rápido posible para determinar si el tratamiento será posible.

## Lesiones A Los Tejidos Blandos De La Boca

Las lesiones en la parte interior de la boca incluyen rupturas, heridas por perforaciones y laceraciones a la mejilla, labios o lengua. La herida debe ser limpiada inmediatamente y la persona lesionada debe ser llevada a la sala de urgencias para suturar y reparar la herida.

El sangrado causado por una laceración a la lengua puede ser minimizado tirando la lengua hacia el frente y utilizando gasa para ejercer presión sobre el área de la herida.